



HBV - HCV - HIV:
THREE DIFFERENT AND SERIOUS THREATS FOR EUROPEAN YOUNG PEOPLE.
A NETWORK TO STUDY AND TO FACE THESE CHALLENGES IN THE
PARTICIPATING COUNTRIES.



HIV

Definitie

Sindromul de imunodeficienta dobândita (SIDA- in limba franceza **Sindrome d'immunodeficiency acquise** sau **AIDS-** in limba engleza **Acquired Immunodeficiency Syndrom**) este ultima faza a evolutiei infectiei cu **virusul imunodeficientei umane (HIV-** Human Immunodeficiency Virus).

Infectia cu HIV parurge mai multe stadii clinice:

1. infectia primara sau sindromul retroviral acut (sindrom pasager asemanator mononucleozei infectioase);
2. infectia asimptomatica;
3. ARC (AIDS related complex) definit de limfadenopatie generalizata persistenta si un grup de infectii oportuniste fara risc vital (leucoplakia orala paroasa, candidaze, etc).
4. AIDS/SIDA – etapa marcata de evolutia unor infectii oportuniste cu risc vital, de neoplasme oportuniste si/sau de manifestari directe ale citopatogenitatii HIV care, de asemenea, ameninta viata .

Diagnosticul infectiei HIV cuprinde urmatoarele etape:

- Diagnosticul de triaj care se realizeaza prin teste imunoenzimatiche (directe sau indirecute) sau prin teste rapide de imunoaglutinare.
- Diagnosticul de confirmare care se realizeaza cel mai frecvent prin Western-Blot, iar alternativ prin imunofluorescenta sau radioimunoprecipitare (RIPA);
- Determinarea încărcării virale (numar copii ARNHIV/ml plasma), obisnuit realizata prin amplificare genica dupa reverstranscriere (RT-PCR pentru ARN/HIV),

Cai de transmitere

- Percutan sau permucos, prin contact cu fluide infectioase provenite de la persoane infectate- (prin injectii, transfuzii, manevre stomatologice sau chirurgicale cu instrumentar incord sterilizat, folosirea in comun de ace, siringi și alte instrumente necesare consumului de droguri, tatuaje, piercing, etc).
- Sexual (homo si heterosexual). Utilizarea constanta, cu toti partenerii sexuali a



HBV - HCV - HIV:
THREE DIFFERENT AND SERIOUS THREATS FOR EUROPEAN YOUNG PEOPLE.
A NETWORK TO STUDY AND TO FACE THESE CHALLENGES IN THE
PARTICIPATING COUNTRIES.



prezervativului reduce riscul de transmitere a infectiei.

- Materno-fetal (intrapartum; peripartum si post-partum)

Preventie

In prezent nu exista un vaccin impotriva infectiei HIV. Desi enorma variabilitate a virusului este un obstacol major, exista unele descoperiri ce sustin posibilitatea creerii unui vaccin eficient in infectia HIV:

- existenta unor subiecti care râmân neinfectati în ciuda expunerii repeatate la virus;
- demonstrarea unui răspuns imun robust la nonprogresori;
- capacitatea răspunsului imun de-a controla încărcarea virală mult timp în faza de latentă;
- rezultate promitătoare cu vaccinuri în infectia SIV la maimute.

Deoarece HIV se transmite prin sange si lichide biologice, **prevenirea transmiterii infectiei pe cale percutana si permucoasa** se poate realiza prin:

- Triajul donatorilor de sange pentru prezenta infectiei HIV (obligatoriu in Romania dupa 1990)
- Utilizarea acelor de unica folosinta in cazul tatuajelor si body piercing-urilor;
- Sterilizarea corecta a instrumentelor folosite la cosmetica, manichiura sau frizerie;
- Evitarea consumului ilegal de drogurile; in cazul consumatorilor de droguri injectabile-utilizarea acelor si siringilor de unica folosinta si evitarea folosirii in comun a acelor, seringilor si altor echipamente de preparare a drogurilor
- Respectarea bunelor practici pentru utilizarea, depozitarea si distrugerea acelor de seringa de catre personalul medical.
- Evitarea folosirii in comun a obiectelor personale precum periuta de dinti, aparate de ras, cercei, forfecute, unghiera
- Masuri de precautie universala

ABC-ul **preventiei transmiterii sexuale** a infectiei HIV include :

A (Abstain from sex) - abstinenta sexuala sau intarzierea inceperii vietii sexuale;



HBV - HCV - HIV:
THREE DIFFERENT AND SERIOUS THREATS FOR EUROPEAN YOUNG PEOPLE.
A NETWORK TO STUDY AND TO FACE THESE CHALLENGES IN THE
PARTICIPATING COUNTRIES.



B (Be faithful) fidelitatea in cuplul monogam;

C (condom) - Utilizarea constanta si corecta a prezervativului in orice tip de relatie sexuala, cu toti partenerii sexuali.

O interventie profilactica recenta pare promitatoare pentru prevenirea transmiterii sexuale a HIV este reprezentata de un microbicid sub forma unui gel cu administrare vaginala (inainte sau dupa contact sexual) ce contine tenofovir 1%- un analog nucleozidic inhibitor de reverstranscriptaza.

Preventia transmiterii materno-fetale. Administrarea unor medicamente antiretrovirale (optim intr-o combinatie terapeutica inalt eficiente, dar posibil si ca monoterapie-AZT sau nevirapina) atat mamei in cursul sarcinii, in cursul nasterii, cat si nou-nascutului reduc semnificativ riscul infectarii.

Operatia cezariana este recomandata daca mama are incarcare virală ridicata si daca beneficiul depaseste riscurile pentru nou-nascut.

OMS recomanda ca mamele HIV pozitive sa nu alapteze atunci cand alimentatia artificiala este disponibila, acceptabila, sigura. Cu toate acestea, in lipsa existentei unei surse de apa potabila sigura, alaptarea la san este preferabila.

Nu uitati! : Orice program de preventie a raspandirii infectiei HIV trebuie sa combine screeningul, diagnosticul corect si timpuriu si tratamentul.