1 ΣΤΟΥΣ 2 ΧΡΗΣΤΕΣ ΜΕ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ

Μέσο:. . . . . .ΕΘΝΟΣ
Ημ. Έκδοσης:. . .29/3/2010 Ημ. Αποδελτίωσης:. . .29/3/2010
Σελίδα:. 22

Innews ΑΕ - Αποδελτίωση Τύπου - http://www.innews.gr

Στοιχεία του ΚΕΘΕΑ και του 18 ΑΝΩ για τους τοξικομανείς

1 στους 2 χρήστες με ηπατίτιδα C

Κοινή χρήση κάποιου ενέσιμου «εξοπλισμού» έχει κάνει έστω και μία φορά το 54,4%. Μάστιγα οι μολυσματικές ασθένειες που κάνουν θραύση στις ηλικίες μεταξύ 25-34 ετών

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΓΚΕΛΥ ΑΛΜΑΛΙΩΤΟΥ-ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ

«Θερίζει» η ηπατίτιδα C στους χρήστες ενέσιμων ναρκωτικών, καθώς, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΚΕΘΕΑ και του «18 Ανω», το ποσοστό μολυσμένων από αυτό τον ιό ανέρχεται έως και 55,5%.

Εφιαλτικό είναι το στοιχείο σύμφωνα με το οποίο σημαντικό ποσοστό χρηστών ενέσιμων ναρκωτικών δεν χρησιμοποιούν ποτέ προφυλακτικό (!), ούτε όταν έχουν σταθερό σύντροφο (56,1%) ούτε όταν πρόκειται για περιστασιακό τους σύντροφο (21,3%).

Επίσης, παράγοντας υψηλού κινδύνου για τη μόλυνση από αυτό τον ιό αποτελεί το γεγονός ότι ένας στους δύο -δηλαδή ποσοστό 54,4%- δηλώνει ότι έχει κάνει κοινή χρήση, έστω και μία φορά στη ζωή του, κάποιου ενέσιμου ή και μη ενέσιμου «εξοπλισμού» (σύριγγα, βαμβάκι, κουτάλι, νερό, καλαμάκι κ.λπ.). Το 60,3% των ΧΕΝ που έχουν κάνει κοινή χρήση ενός τουλάχιστον από τα σύνεργα έχει μολυνθεί από τον ιό της ηπατίτιδας C.

Σημαντικό ποσοστό χρηστών ενέσιμων ναρκωτικών δεν χρησιμοποιεί ποτέ προφυλακτικό

Χαμηλότερα είναι τα ποσοστά για τις υπόλοιπες μολυσματικές ασθένειες που μαστίζουν τους τοξικομανείς, όπως η ηπατίτιδα Α (7,7%), η ηπατίτιδα Β (έως 2,7%), το AIDS (έως 3,4%) καθώς και η φυματίωση (έως 7,3%).

Οι μολυσματικές ασθένειες στους τοξικομανείς κάνουν θραύση στις ηλικίες μεταξύ 25-34 ετών, ενώ έχουν ως θλιβερούς «πρωταγωνιστές» κυρίως τους άνδρες.

Σύμφωνα με στοιχεία που απέστειλαν το ΚΕΘΕΑ και το «18 Ανω» στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ) -το οποίο επίσης συμμετείχε ως πηγή σχετικών πληροφοριών-, κατά το 2008 εξετάστηκαν 1.578 περιπτώσεις χρηστών ενέσιμων ουσιών (ΧΕΝ) σχετικά με τις προαναφερόμενες μολυσματικές ασθένειες.

Μόλυνση από ηπατίτιδα C

Ο πίνακας, που ακολουθεί, αποτυπώνει περίφραγνα την εικόνα των υψηλών ποσοστών μόλυνσης από ηπατίτιδα C στους ΧΕΝ για το διάστημα 2002 έως και 2008. Οπως φαίνεται, το 2002 το ποσοστό μόλυνσης από αυτόν τον ιό κυμάνθηκε από 40,8% έως 62,0%. Αντίστοιχα το 2008 άρχισε από 44,2% και έφτασε στο 55,5%



ΠΗΓΗ: ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΤΕΠΝ, ΚΕΘΕΑ ΚΑΙ 18 ΑΝΩ

Ψηλά τα ποσοστά μόλυνσης στις ηλικίες 25-34 ετών

Τα ποσοστά μόλυνσης από τον ιό της ηπατίτιδας C είναι υψηλότερα στους ΧΕΝ 25-34 ετών και σε εκείνους τους χρήστες που έχουν στο ενεργητικό τους δύο ή και περισσότερα χρόνια ενέσιμης χρήσης. Για το σύνολο της επταετίας 2002-2008 η τάση παρά τις χρονικές διακυμάνσεις- είχε καθαρά ανοδική πορεία. Το 2002 οι τοξικομανείς ηλικίας κάτω των 25 ετών είχαν μολυνθεί σε ποσοστό 38%



ΠΗΓΗ: ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΤΕΠΝ

Η μόλυνση από το AIDS

Σύμφωνα με στοιχεία του ΚΕΕΛΠΝΟ (Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων), από τον συνολικό αριθμό των 9.229 δηλωθέντων HIV θετικών ατόμων στην Ελλάδα από το 1984 μέχρι και τις 31-10-'08, οι 317 (ποσοστό 3,4%) είναι χρήστες ενέσιμων ναρκωτικών. Από τα άτομα αυτά οι 248 (78,2%) είναι άνδρες και οι 69 (21,8%) είναι γυναίκες. Η έρευνα για το 2008 δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί

Η μόλυνση από τη φυματίωση

Από τους 112 χρήστες ενέσιμων ναρκωτικών που εξετάστηκαν το 2008 από το δίκτυο ΕΚΤΕΠΝ, το 47,3% ήταν θετικοί στο τεστ Mantoux. Από τους 286 που εξετάστηκαν από το ΚΕΘΕΑ τον ίδιο χρόνο, το 7,3% ήταν θετικοί στο ίδιο τεστ. Από τους 31 που εξετάστηκαν από το 18 ΑΝΩ, θετικοί ήταν το 6,5%.

ΜΟΝΟΝ ΕΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΞΙ ΕΧΕΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ

Στο 2,7% το ποσοστό μόλυνσης για ηπατίτιδα Β

ΤΟ 2008 στην Ελλάδα τα ποσοστά μόλυνσης από ηπατίτιδα Β των ενέσιμων χρηστών κυμαίνεται από 2,3% έως 2,7%. Η μετάδοση του ιού οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην παρεντερική χρήση ναρκωτικών. Σε μεγαλύτερο ποσοστό μολύνονται οι άνδρες (2,9%) έναντι 1,3% των γυναικών. Οι ΧΕΝ που μολύνονται με ηπατίτιδα Β είναι κυρίως άτομα ηλικίας 25 ετών και άνω. Οι «παλιοί» χρήστες ενέσιμων ναρκωτικών παρουσιάζουν σημαντικά υψηλότερα ποσοστά ιστορικού μόλυνσης σε σύγκριση με τους «νέους» ΧΕΝ (27,2% και 13,3%, αντίστοιχα). Οπως προκύπτει, μόνο ένας στους 6 (ποσοστό 16,6%) εξεταζόμενους χρήστες έχει εμβολιαστεί για τον ιό της ηπατίτιδας Β. Το ποσοστό των εμβολιασθέντων δεν διαφέρει μεταξύ ανδρών (16,6%) και γυναικών (16%). Ωστόσο, ο εμβολιασμός είναι πιο συχνός στους χρήστες που δεν έχουν κάνει ποτέ ενέσιμη χρήση ναρκωτικών (22,2%).

Ο ΙΟΣ ΧΤΥΠΑ ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ

ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΑ δείχνουν τα στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά για τον ιό της ηπατίτιδας C, καθώς είναι εξαιρετικά υψηλά. Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2008, η μόλυνση από αυτόν τον ιό στους ΧΕΝ (Χρήστες Ενέσιμων Ναρκωτικών) στην Ελλάδα καταγράφηκε μεταξύ 44,2% έως και 55,5%. Η μόλυνση από τον εν λόγω ιό ήταν παρόμοια και στα δύο φύλα (55,8% και 52,5% για τους άνδρες και τις γυναίκες, αντίστοιχα).